

Labar-mota	Karstifikatua (Kareharrizkoa)		Ez karstifikatua (Flyscha, hareharria)		Ezaugarriak
	Asoziazioa	Espezierik ohikoenak	Asoziazioa	Espezierik arruntenak	
I. Gerria: halokasmofitikoak	Crithmo maritimi-Limonietum binervosi	<i>Limonium binervosum</i> , <i>Armeria pubigera</i> , subsp. <i>depilata</i> , <i>Crithmum maritimum</i> , <i>Inula crithmoides</i> , <i>Plantago maritima</i>	Crithmo maritimi-Plantaginetum maritimae	<i>Plantago maritima</i> , <i>Crithmum maritimum</i>	Olatuen erasoaldi bizia da, eta, beraz, sarri jasotzen ditu itsasoko uraren zipriztinak. Areago, itsasoa haserretzen denean, olaturen batek ere harrapa dezake. Horrez gain, malda ia bertikala eta oso ezegonkorra denez, ezin da lurzorurik sortu. Harrien arrailetan baino ez dira bizi landare bakan batzuk, arrail horien babes apurrean lortzen baitute landare horiek hain muturreko baldintzetan bizitzea. Gazitasuna (halofitoak) eta harrietako arrakaletan bizitzea (kasmofitoak) jasan behar dute landare horiek. Bi baldintza horien konbinazioak zorrotz hautatzen ditu ingurune horietan aurki daitezkeen espezieak. Beraz, oso espezie gutxi osatzen dituzte gerri hori populatzen duten komunitateak, eta oso biomasa eta estaldura urria dute.
II. Gerria: Gramineo iraunkor eta nanofrutizado aereohalinoak	Leucanthemo crassifoliae-Festucetum pruinosa armerietosum depilatae	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>pruinosa</i> , <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>iberica</i> , <i>Crithmum maritimum</i> , <i>Dactylis glomerata</i> var. <i>maritima</i> <i>Daucus carota</i> subsp. <i>gummifer</i> , <i>Leucanthemum ircutianum</i> subsp. <i>crassifolium</i> , <i>Plantago maritima</i> , <i>Lotus corniculatus</i> var. <i>crassifolius</i> , <i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>biformis</i> y <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>uniflora</i> , <i>Armeria pubigera</i> subsp. <i>depilata</i>	Leucanthemo crassifoliae-Festucetum pruinosa Festucetosum pruinosa	Aurreko azpiasoziazioaren berdina, baina <i>Armeria pubigera</i> subsp. <i>depilata</i> gabe	Urruntasuna dela eta, itsasoaren eragina arinagoa da. Itsas haizearen (maresia) edo brisaren eragina baino ez dute jasotzen: ur gazi tanta txiki batzuk garraiatzen ditu haize horrek, eta gatzatu egiten ditu jotako gainazalak. Gerri horretara ez da iristen itsasoaren zipriztinik: oso aldian behin baino ez, erasoaldi gogorrenetan. Gazitasuna nabarmena da, baina prezipitazioek arindu egiten dute; hortaz, udazkenean eta udaberrian pilatzen duen euriarekin gazitasuna gutxitu egiten da, eta udan, agorraldian, handitu. Nolanahi ere, substratuen malda txikiagoa eta egonkortasuna handiagoa denez, lurzorua eratzeko aukera handiagoa da. Beraz, biomasa eta dibertsitate handiagoko komunitateak egon daitezke. Horien artean, gramineo betiberde espezie bat da nagusi, <i>Festuca rubra</i> subsp. <i>pruinosa</i> ; hainbat tamainatako arrailak hartzen ditu, edo, areago, tapiz iraunkorra osatzen du batzuetan.
			Festuco pruinosa-Armerietum euscadiensis	Aurreko azpiasoziazioaren berdina, baina <i>Armeria pubigera</i> subsp. <i>depilata</i> gabe	
III. Gerria: Sastraka eolohalifiloak	Ulici (galli) humilis-Ericetum vagantis	<i>Ulex gallii</i> f. <i>humilis</i> , <i>Erica cinerea</i> , <i>Erica vagans</i> , <i>Genista occidentalis</i> y <i>Lithodora diffusa</i> , <i>Dactylis glomerata</i> var. <i>maritima</i> , <i>Daucus carota</i> subsp. <i>gummifer</i> , <i>Festuca rubra</i> subsp. <i>pruinosa</i> , <i>Leucanthemum ircutianum</i> subsp. <i>crassifolium</i> , <i>Lotus corniculatus</i> var. <i>Crassifolius</i> , <i>Plantago maritima</i>	Genisto occidentalis-Ulicetum maritimi	Aurrekoa gehi <i>Genista occidentalis</i> eta <i>Ulex gallii</i> f. <i>humilis</i> gabe	Itsas haizea edo maresia leundu egiten da barrualdera; hala, itsasoko ur tanta lodienak lehorreraten dira lehenbizi, eta, aldiz, txikienak oso barrura irits daitezke haizeak bultzatuta. Horren ondorioz, gerri horretara gatz gutxiago iristen da, baina nabaritzen da, hala ere; horren adierazle da landare halofilo batzuen presentzia. Gatza ez da, hortaz, tarte horretako landaredia gehien mugatzen duena, ez eta lurzorua ere –garapen handi samarra izatera irits daiteke–, haizea baizik. Haizearen eragin mekanikoak, lehorgarri eta urragarriak, eragiten ditu muluen kuxin-erako formak; ote zuri, otabera, txilar eta abarrenak.